

Información sobre pruebas de alergia y lista a evitar de antihistamínicos

Algunos medicamentos pueden interferir con las pruebas cutáneas de alergia. Para obtener los mejores resultados, **deje de tomar antihistamínicos contra las alergias como se indica a continuación antes de su consulta de nuevo paciente y antes de otras consultas si piensa hacerse pruebas cutáneas.** Si tiene alguna pregunta sobre seguridad por dejar de tomar su antihistamínico, póngase en contacto con el médico que se lo recetó.

No se ponga aceite, crema o loción en la espalda o los brazos menos de 24 horas antes de las pruebas cutáneas.

No deje de usar sus inhaladores contra el asma que se usa diariamente.

Si aparecen urticarias después de suspender los antihistamínicos, comuníquese con el consultorio y reanude el tratamiento con antihistamínicos.

DEJE DE TOMAR LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS 7 DÍAS ANTES DE IR A LA CONSULTA:

- Ciproheptadina (Periactin)
- Hydroxyzina (Atarax/Vistaril)
- Desloratidina (Clarinox)
- Levocetirizina (Xyzal)

DEJE DE TOMAR LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS 5 DÍAS ANTES DE IR A LA CONSULTA:

Medicamentos sedantes contra las alergias (todas las formas)

- Advil Allergy
- Alahist
- AlleRX
- Allergy Relief
- Bromfeniramina (Bromfed)
- Carbinoxamina
- Clorfeniramina
- Clor-trimeton
- Difenhidramina (Benadryl)
- Doxilamina
- Extendryl
- Ketotifeno
- Palgic
- Polihistidina
- Pýrilamina (también se encuentra en el Midol)
- Tylenol Allergy

Medicamentos no sedantes contra las alergias (todas las formas)

- Cetirizina (Zyrtec, Wal-Zyr)
- Fexofenadina (Allegra)
- Loratadina (Claritin, Alavert)

Rociados nasales

- Azelastina (Astelin, Astepro)
- Dymista
- Olopatadina (Patanase)

Reductores de acidez estomacal

- Cimetidina (Tagamet)
- Famotidina (Pepcid)

Remedios para la tos, el resfriado y la sinusitis

- Actifed
- Advil Cold/Sinus
- Aleve Cold
- Alka Seltzer Plus/Cold
- Allerest
- BC Cold Powder
- Benylin Cough
- Comtrex
- Contac
- Coricidin
- Co-Tylenol
- Dimetane
- Dimetapp
- Drixoral
- Norel SR/MD
- Nyquil
- Pediacare
- Percogesic
- Feniltoloxamina
- Robitussin (muchas formas)
- Rondec
- Rynatan/R-Tannate
- Semprex-D
- Sinutab
- Sudafed Cold + Allergy
- Tanafed
- Theraflu (todas las formas)
- Time Hist
- Triaminic (todas las formas)
- Tussionex
- Tylenol Cold+Sinus
- Vicks 44 M
- Zicam

Pastillas para dormir

- Advil PM
- Alertec (Modafinil)
- Doxepin (Sinequan)
- Doxilamina
- Excedrin PM
- Night Time Sleep Aid
- Nytol
- Somnex
- Tylenol PM/Tylenol Sleep

Medicamentos contra las náuseas y el vértigo

- Clorpromazina
- Dimenhidrinato (Dramamine)
- Meclizina (Antivert)
- Proclorperazina (Compazine)
- Prometazina (Phenergan)

Gotas para los ojos contra las alergias

- Alcaftadina (Lastacaft)
- Epinastina (Elestat)
- Azelastina (Optivar)
- Ketotifeno (Zaditor, Alaway, Zyrtec)
- Bepotastina (Bepreve)
- Olopatadina (Patanol, Pataday, Pazeo)

Medicamentos contra la picazón:

- Difenhidramina (Benadryl)

Otros:

- Ciclobenzaprina (Flexeril)
- Baclofeno

Hay otros medicamentos que pueden interferir con las pruebas cutáneas de alérgenos, **pero usted debe seguir tomándolos A MENOS QUE el médico o el clínico que se los recetó le diga que es seguro suspenderlos durante 5 días antes de su consulta de alergias.** Su proveedor de Allergy Partners le hablará sobre opciones de pruebas durante la consulta si usted no ha sido autorizado para suspender estos medicamentos:

Antidepresivos tricíclicos

- Amitriptilina
- Amoxapina
- Desipramina (Norpramin)
- Doxepin (Sinaquan)
- Imipramina (Tofranil)
- Nortriptilina (Pamelor)
- Protriptilina
- Trimipramina

Otros

- Mirtazapina (Remeron)
- Quetiapina (Seroquel)

Siga tomando todos sus otros medicamentos recetados, tales como los siguientes:

- Antibióticos
- Antidepresivos
- Medicamentos contra el asma, tales como inhalados, soluciones nebulizadas, Montelukast (Singulair) y Zafirlucast (Accolate)
- Medicamentos para la presión sanguínea
- Medicamentos para el colesterol
- Anticongestivos
- Medicamentos para el corazón
- Medicamentos inyectables
- Rociados nasales excepto Astelin / Astepro / Patanase / Dymista
- Esteroides tales como prednisona / prednisolona / solumedrol / etc.
- Medicamentos para la tiroides

NO deje de tomar estos medicamentos sin la aprobación de su médico.

Llame a la oficina local de Allergy Partners si tiene preguntas acerca de estas listas.